

Informacija o pojavi hripavca

obavještavamo učenike i roditelje naše škole da smo od nadležne epidemiološke službe obaviješteni o tri slučaja hripavca u našoj školi.

Zaraza se širi kapljičnim putem i vrlo je ozbiljna. Počinje kao obična prehlada, zbog čega se blaži oblici čak ne mogu ni klinički prepoznati.

Za sada dijelimo nekoliko općenitih informacija dobivenih od nadležne školske liječnice:

- u slučaju da se sazna da dijete boluje od hripavca **roditelj je dužan odmah obavijestiti školu** koja potom obavještava nadležnog školskog liječnika i epidemiološku službu
- izbjegavati okupljanja djece i druženja djece iz razreda gdje je oboljeli osim na nastavi, odnosno osigurati što manje kontakata sa učenicima iz drugih razreda (tjelesni, slobodne aktivnosti, praksa...)
- pojačati higijenske mjere u učionicama gdje je boravio oboljeli (prozračivanje, čišćenja...)

Simptomi bolesti

Hripavac (pertussis) je bolest dišnih organa koju uzrokuje bakterija Bordetella pertussis tako da je pojava simptoma vezana uz dišni sustav.

Bolest karakteriziraju 3 stadija:

1. stadij traje 1-2 tjedna

- curenje nosa ili začepljen nos i blago povišena temperatura (do 38C)
- kašalj
- teško disanje do prestanka disanja (kod dojenčadi i manje djece)

2. stadij traje 2-6 tjedana a karakteriziraju ga:

- napadaji kašlja u trajanju 1-2 minute, bez udisaja, završavaju duboko uvučenim udisajem (hripanjem), češći su noću

3. stadij je zapravo oporavak koji traje 2- 3 tjedna, može i duže

Od osobe do osobe se lako širi kašljem ili kihanjem. Inkubacija je 6-20 dana. Kašalj kod hripavca može trajati danima ili mjesecima, ponekad dovodi i do povraćanja. Infekcija može osobito biti teška kod dojenčadi i osoba sa oslabljenim imunitetom.

Zahvaljujemo na pomoći i suradnji kako bismo spriječili dalje širenje zaraze.

Stoga slijedom navedenoga preporučujemo RODITELJIMA:

- **Ako Vaše dijete kašlje i/ili ima gore navedene simptome:**
- **Ostavite dijete kod kuće, izolirajte ga, neka ne ide u školu i na izvanškolske aktivnosti**
- **Dogovorite pregled s djetetovim liječnikom što je prije moguće i obavijestite liječnika da je Vaše dijete bilo izloženo hripavcu**
- **Ako Vaše dijete ima oslabljen imunološki sustav (ako dijete i ne kašlje) liječnik će sukladno važećim smjernicama djetetu ordinirati kemoprofilaksu kako bi se spriječila pojava hripavca**
- **Ako Vaše dijete ne kašlje, ali u kućanstvu živi sa: trudnicom, djetetom mlađim od 12 mjeseci, osobom koja ima oslabljen imunitet/imunokompromitirana (pacijenti sa zloćudnim bolestima, pacijenti na kemoterapiji, pacijenti koji uzimaju biološke lijekove, pacijenti sa zatajenjem srca, jetre i slično), liječnik će Vašem djetetu također dati kemoprofilaksu sukladno važećim smjernicama**

Nadalje, ako je Vašem djetetu dijagnosticiran hripavac od strane nadležnog liječnika:

- **javite školi da je Vaše dijete oboljelo od hripavca, a oni će obavijestiti nadležnog epidemiologa i liječnika školske medicine**
- **dijete se može vratiti u školu po završenoj terapiji i prestanku simptoma bolesti o čemu Vam potvrdu izdaje nadležni liječnik opće medicine**

Preporuka je da provjerite cjepne statuse djeteta i druge djece u kućanstvu vezano uz hripavac.

Zaštita dobivena cijepljenjem se smanjuje tijekom vremena.

Preporuka za ŠKOLU:

- **u slučaju da se roditelj javi sa informacijom da dijete boluje od hripavca, odmah obavijestiti nadležnog školskog liječnika i epidemiološku službu**
- **izbjegavati okupljanja djece i druženja djece iz razreda gdje je oboljeli osim na nastavi, odnosno osigurati što manje kontakata sa učenicima iz drugih razreda (tjelesni, slobodne aktivnosti, praksa...)**
- **pojačati higijenske mjere u učionicama gdje je boravio oboljeli (prozračivanje, čišćenje...)**

Ravnatelj škole: Darko Grgurić, prof.